



Essere protagonista della prevenzione

1. Scopri se sei a rischio

- Parla con i tuoi parenti** per apprendere di più sulla storia clinica della tua famiglia
- Parla con il tuo medico** dei fattori di rischio per il tumore al seno

2. Sottoponiti allo screening

- Chiedi al tuo medico** quali test di screening sono più adatti al tuo caso, se il tuo fattore rischio è elevato
- Sottoponiti ad una mammografia** ogni anno una volta raggiunti 40 anni se il fattore rischio è medio
- Sottoponiti a una visita clinica** al seno almeno ogni 3 anni iniziando a 20 anni, ed ogni anno iniziando a 40 anni

3. Prendi confidenza con il tuo seno

- Consulta il tuo medico se noti uno di questi cambiamenti nel seno:
 - Un nodulo duro o che tende a indurirsi all'interno del seno o nella zona ascellare
 - Gonfiore, sensazione di calore, rossore o colorazione scura di aree del seno
 - Cambio di forma o dimensione del seno
 - Apparizioni di lievi depressioni o retrazioni sulla pelle del seno
 - Lesioni, aree pruriginose o squamate, oppure un'inflammatione sul capezzolo
 - Rientranze nel capezzolo o in altre parti del seno
 - Secrezioni mai notate dal capezzolo
 - Dolore improvviso localizzato e persistente

4. Adotta uno stile di vita sano

- Mantieni il peso forma
- Pratica dell'esercizio fisico quotidianamente
- Limita il consumo di alcool
- Limita l'assunzione di terapia ormonale sostitutiva
- Allatta al seno se possibile

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito web oppure contatta la nostra assistenza telefonica per la cura del seno.

www.komen.org 1-877 GO KOMEN (1-877-465-6636)

Prendi confidenza con il tuo seno

I sintomi del cancro al seno non sono uguali per tutte le donne. È importante sapere che aspetto ha normalmente il tuo seno e qual è la sensazione normale al tatto. Se noti dei cambiamenti, consulta il tuo medico.

I cambiamenti da tenere sotto controllo sono:

- Un nodulo duro o che tende a indurirsi all'interno del seno o nella zona ascellare



- Gonfiore, sensazione di calore, rossore o colorazione scura di aree del seno



- Cambio di forma o dimensione del seno



- Apparizioni di lievi depressioni o retrazioni sulla pelle del seno




- Lesioni, aree pruriginose o squamate, oppure un'inflammatione sul capezzolo



- Rientranze nel capezzolo o in altre parti del seno



- Secrezioni mai notate dal capezzolo



- Dolore improvviso localizzato che non si attenua e non sparisce

